

Порядок действий при возникновении случаев энтеровирусных инфекций (ЭВИ) в детской образовательной организации, при выявлении признаков инфекционного заболевания у ребенка в ходе утреннего фильтра или в течение пребывания в образовательной организации:

Следует помнить, что резервуаром и источником энтеровирусной инфекции является больной человек или инфицированный бессимптомный носитель вируса. Доказана высокая контагиозность энтеровирусов (способность вызывать заражение). Инфицированные лица наиболее опасны для окружающих в ранние периоды инфекции.

Вирус весьма эффективно заражает маленьких детей при попадании небольшой дозы пероральным путём. Инкубационный период энтеровирусной инфекции варьируется от 2 до 35 дней, в среднем — до 1 недели.

Пути передачи — водный, пищевой, контактно-бытовой, воздушно-капельный. Воздушно-капельный пути передачи реализуется реже, но возможен в организованных детских коллективах, при тесном контакте среди детей.

Факторами передачи служат вода, овощи, фрукты, контаминированные энтеровирусами. Также вирус может передаваться через грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды.

1. При наличии признаков инфекционного заболевания, в том числе сходных с проявлениями острой респираторной инфекции, не принимать ребенка в группу, объяснить родителям, что ребенок может представлять опасность для других детей, что им необходимо обратиться за медицинской помощью для оценки состояния здоровья ребенка. Особое внимание обращать на детей, которые вернулись в образовательную организацию после отсутствия, выезжали с родителями на отдых, которые могут вернуться в организацию в инкубационном периоде, а симптомы могут появиться позже.
2. При установлении признаков инфекционного заболевания у ребенка при пребывании в образовательной организации – выделить его из коллектива, поместить в изолятор. Принять меры к тому, чтобы дети из группы, где выявлен ребенок с признаками инфекции, гуляли и принимали пищу, не пересекаясь с детьми из других групп (максимальное ограничение контактов). В группе увеличить кратность дезинфекционных мероприятий, режима проветривания, использование средств обеззараживания воздуха.
3. При возникновении случаев ЭВИ - информировать о возникновении ЭВИ соответствующий территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Саратовской области в целях своевременного начала эпидемиологического расследования.
4. При наличии бассейна в образовательной организации немедленно прекратить его использование до проведения результатов эпидемиологического расследования. Слив воды и дезинфекцию бассейна провести после отбора проб на исследование специалистами Роспотребнадзора.

5. Прекратить прием новых или временно отсутствующих детей в карантинную группу или образовательную организацию (при возникновении случаев ЭВИ в разных группах), запретить перевод детей из карантинной группы в другие.
6. Прекратить (отменить) мероприятия (занятия) с участием детей из разных групп, использование мягких игрушек. Установить питьевой режим только с использованием кипяченой воды или бутилированной воды гарантированного качества.
7. Выполнить все требования предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ЭВИ, выданного территориальным отделом управления по результатам эпидемиологического расследования.
8. Осуществлять контроль за состоянием здоровья детей и персонала, за результатами медицинского наблюдения за детьми, своевременно выделять из коллектива детей и лиц из числа персонала с признаками инфекционного заболевания, информировать сотрудников образовательной организации о мерах профилактики и необходимости обращения за медицинской помощью при наличии признаков инфекционного заболевания.
9. Провести занятие с персоналом образовательной организации о мерах профилактики ЭВИ, особенностях дезрежима при вирусных инфекциях, факторах передачи, организации наблюдения за детьми и их состоянием.
10. Усилить контроль за соблюдением противоэпидемического и дезинфекционного режима в образовательной организации, соблюдением режима проветривания, организацией питания, поступлением и обработкой пищевых продуктов, отбором и хранением суточных проб.
11. Организовать активную работу с родителями (законными представителями детей) о мерах профилактики энтеровирусных инфекций, при этом можно использовать материалы, разработанные Роспотребнадзором, размещаемые на сайте управления. Информировать их, в том числе, об опасности в период подъема заболеваемости энтеровирусными инфекциями купания детей в открытых водоемах, фонтанах, бассейнах развлекательных центров, аквапарках, личных бассейнах при несоблюдении режимов смены воды и дезинфекции бассейнов.
12. По согласованию с врачом-инфекционистом возможна организация применения средств неспецифической экстренной профилактики в виде иммуномодуляторов и противовирусных средств.